

Gastrointestinale Pilzvergiftung, Pilzindigestion

NOTFALL / URGENCE 145
TEL +41 44 251 66 66
FAX +41 44 252 88 33
E-MAIL info@toxinfo.ch
INTERNET www.toxinfo.ch

K. Schenk – Jäger, H. Kupferschmidt



- Ursachen** Speisepilze (verdorbene oder grosse Mengen)
Roh und gekocht verursachen folgende Pilze gastrointestinale Symptome: *Hypholoma fasciculare* (Grünblättriger Schwefelkopf), *Agaricus xanthoderma* (Karbol-Egerling), *Entoloma sinuatum* (Riesenrötling), *Lactarius* sp. (Milchlinge), scharfe *Russula* sp. (Täublinge), *Omphalotus olearius* (Ölbaumpilz), *Paxillus involutus* (Kahler Krempling), *Tricholoma pardalotum* (Tiger-Ritterling) u.a.m.
- Toxine** Neben giftigen (ungeniessbaren) Pilzen können Symptome auch durch verdorbene Pilze oder durch eine individuelle Unverträglichkeit gegenüber Pilzen verursacht werden.
- Klinik** Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Hypotonie. Meist kurze Latenzzeit (2-6 h).
- Therapie** symptomatisch (Flüssigkeits- und Elektrolytersatz)
- Prognose** gut
- Literatur** Flammer R Giftpilze, AT-Verlag, Aarau 2014